

北京稠李属一新种^①

韩英兰 杨昌友

A NEW SPECIES OF THE GENRA PADUS FROM BEIJING

Han Ying-lan Yang Chang-you

〔摘要〕本文发表了北京产稠李属一新种, 北京稠李 *Padus Beijingensis* Y.

L. Han et C. Y. Yang.

关键词 稠李属; 新种; 北京稠李

Key words *Padus*; New species; *Padus Beijingensis*

北京稠李 新种 图

Padus Beijingensis Y. L. Han et C. Y. Yang sp. nov.—*P. racemosa* var. *pubescens* (Rgl. et Tiling) #auct. non Schneid.

Species *P. velutina* (Batal.) #Schneid. affinis, sed pedicellis 12mm longis (nec 5mm), glaberis (nec pubescentibus), sepalis extus albo—pilis (nec glabris), tubis calycum intra dense velutinis (nec glabris pilosisve), stylis stamina breviora superantibus vel staminibus longioribus aequilongis, (nec 1/2 brevioribus) bene differt.

Frutex circa 3m altus; ramuli homotini fulvidi dense pubescentes, annotini brumeoli, primum cinereo—pubescentes, deinde pratin glabrescentes, lenticellis manifestis; gemma ovata puberula. Folia longe elliptica vel ovato—elliptica, 5.5—6cm longa, apice acuminata, basi late cuneata, margine serrata raro duplicatoserrata, supra viridia, impressinervia, secus costas verasque laxae velutina, subtus viridula, dense infusato—pubescentia, matura pilosa, nervis mediis lateralibusque valde elevatis, nervis lateralibus in margine anastomosantibus; petioli 0.6—1cm longi dense flavopubescentes. racemi circa 20—26—Flores, pedunculo 6—8cm longo inferne dense pubente, saepiuscule 2—3—foliato, pedicellis fere glabris; flores parvi circa #6—8mm diam; Calycum tubis campanulatis, intra dense velutinis, sepalis 5, triangulata, tubo dilute brev-

① 韩英兰:天津, 天津农学院(Tianjin Agricultural College, Tianjin 300381)。

杨昌友:新疆, 乌鲁木齐, 新疆农业大学(Xinjiang Agricultural University, Urumqi 830052)。

* 此项工作得到国家自然科学基金资助项目 9390010—8—2 资助。

1995年5月收到本文。

iora, margine glomdulosó—serrulata, extus albopilosa; ovaria globosa glabra. Fructus ignotus.

Beijing (北京): Yanqing Xian (延庆县) Songshan (松山), alt 1150m, in fruticetis montanis, 1987, 5, 24, Li Xiao—yun (李晓云) 424 (Typus BJFC).

灌木, 高约 3m; 嫩枝淡黄褐色, 密被绒毛, 去年生枝红褐色, 初期密被灰色绒毛, 后部分光滑, 皮孔明显; 冬芽卵形, 被短绒毛。叶片长圆形或卵状椭圆形, 5.5—6cm, 宽 3—3.5cm, 先端渐尖, 基部阔楔形, 边缘具单锯齿, 稀重锯齿, 上面绿色, 主脉微凹陷, 沿主脉及侧脉被疏绒毛, 下面淡绿色, 密被黄色绒毛, 成熟叶被疏毛, 主脉和侧脉甚隆起, 侧脉在边缘结网; 叶柄长 0.6—1cm, 密被黄色绒毛。总状花序具 20—26 朵花, 花序梗长 6 至 8cm, 下部被绒毛, 基部常具 2—3 小叶, 花梗长 5—12mm, 几光滑无毛; 花小, 直径 6—8mm, 萼筒钟状, 萼齿三角形, 销短于萼筒, 边缘具细腺齿, 外面被白色绒毛, 萼筒内部密被短绒毛, 花柱长于短雄蕊或等长于长雄蕊; 子房球形, 无毛, 果实未见。

北京: 延庆县, 松山大西沟, 海拔 1150m, 山地灌丛, 1987 年 5 月 24 日, 李晓云 424 (模式藏北京林业大学森林植物标本馆); 松山闫空坪, 河岸边, 海拔 1100m, 1988 年 5 月 26 日, 任宪威, 无号, 海陀山, 山坡石缝, 海拔 1988m, 1987

图 北京稠李

Padus Beijingensis Y. L. Han et C. Y. Yang sp. nov.

年 5 月 25 日, 李晓云 424 号。

本种近似毡毛稠李 *Padus velutina* (Batal.) Schneid, 但花梗长至 12mm (非为 5mm), 无毛 (非为短绒毛), 萼片外面有白色柔色毛 (非为无毛), 萼筒内部密被短绒毛 (非疏毛或无毛), 花柱长于短雄蕊或等长于花丝 (非短于 1/2) 而很好区别。